

SCINTIGRAFIA MIOCARDICA

PREPARAZIONE

Digiuno da almeno 5 ore

Il digiuno non presuppone la sospensione di farmaci.

Farmaci

Per eventuale sospensione di farmaci o terapia seguita, il paziente dovrà rivolgersi al cardiologo curante.

Non assumere da almeno 24 ore:

Thè, caffè, bevande a base di cola (coca cola, pepsi...) e cioccolato.

Portare tutta la documentazione cardiologica precedente anche di vecchia data (elettrocardiogramma, test ergometrico, cartelle cliniche, ecc.).

Indossare abiti e scarpe comode (preferibilmente tuta e scarpe da ginnastica).

Gli uomini devono presentarsi con il torace depilato.

DIZIONE IMPEGNATIVE

PRIMA IMPEGNATIVA

- Visita specialistica medico nucleare
- Angiocardioscintigrafia di primo passaggio
- Tomoscintigrafia miocardica (spet) di perfusione a riposo
- Tomoscintigrafia miocardica (spet) di perfusione dopo stimolo

SECONDA IMPEGNATIVA

- Visita cardiologica e ECG

Il paziente sarà radioattivo nelle 24 ore successive all'esame e dovrà pertanto evitare contatti con bambini, donne in gravidanza o sostare nelle aree comuni.